

ICS 71. 100. 01; 87. 060. 10

G 57

备案号：56328—2016

HG

# 中华人民共和国化工行业标准

HG/T 3429—2016

代替 HG/T 3429—2010

## 分散红 S-5BL (C. I. 分散红 167 : 1)

Disperse red S-5BL (C. I. Disperse red 167 : 1)

2016-10-22 发布

2017-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准代替 HG/T 3429—2010《分散红 S-5BL (C.I. 分散红 167 : 1)》。与 HG/T 3429—2010 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 增加了测色色光指标（见 3.1）；
- 修改了有害芳香胺控制指标和试验方法（见 3.1、5.8，2010 年版的 3.2、5.8）；
- 修改了外观评定方法的表述（见 5.1，2010 年版的 5.1）；
- 修改了有关染色浴比的表述（见 5.2.1，2010 年版的 5.2.1）；
- 修改了色光和强度的评定的表述，增加了测色色光试验方法（见 5.2.4，2010 年版的 5.2.4）；
- 增加了上色率测定的染色深度规定（见 5.6）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会（SAC/TC134）归口。

本标准起草单位：杭州吉华东化工有限公司、沈阳化工研究院有限公司、国家染料质量监督检验中心。

本标准主要起草人：陈美芬、马君庆、董仲生、姬兰琴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- ZB G 57 022—1990；HG/T 3429—1990；HG/T 3429—2000；HG/T 3429—2010。


分散红 S-5BL (C. I. 分散红 167 : 1)

## 1 范围

本标准规定了分散红 S-5BL (C. I. 分散红 167 : 1、分散红玉 S-2GFL) 产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

本标准适用于分散红 S-5BL 的产品质量控制。

结构式：



分子式：C<sub>22</sub>H<sub>24</sub>ClN<sub>5</sub>O<sub>7</sub>

相对分子质量：505.91（按2013年国际相对原子质量）

CAS RN: 1533-78-4

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2374—2007 染料 染色测定的一般条件规定

GB/T 2394—2013 分散染料 色光和强度的测定

GB/T 2397 分散染料 提升力的测定

GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922—2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 4841.1—2006 染料染色标准深度色卡 1/1

GB/T 5540 分散染料 分散性能的测定 双层滤纸过滤法

GB/T 5541 分散染料 高温分散稳定性的测定 双层滤纸过滤法

GB/T 5718—1997 纺织品 色牢度试验 耐干热(热压除外) 色牢度

GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度

GB/T 6678—2003 化工产品采样总则

GB/T 6688—2008 染料 相对强度和色差的测定 仪器法

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 9337—2009 分散染料 高温染色上色率的测定

GB 19601 染料产品中 23 种有害芳香胺的限量及测定

GB 20814 染料产品中重金属元素的限量及测定

GB/T 24101 染料产品中4-氨基偶氮苯的限量及测定

GB/T 27597 染料 扩散性能的测定

### 3 要求

#### 3.1 分散红 S-5BL 的质量要求

应符合表 1 的规定。

表 1 分散红 S-5BL 的质量要求

项 目		指 标		试验方法
(1) 外观		红褐色均匀粉末或颗粒		5.1
(2) 强度(为标准品的)/分		100		5.2
(3) 色光(与标准品)	目测	近似~微		5.2
	测色(D65 光源) <sup>a</sup> ： DE DC DH	0.50 -0.30~0.30 -0.30~0.30		5.2
(4) 扩散性能/级		4		5.3
(5) 分散性/(级/级)		A/3		5.4
(6) 高温分散稳定性/(级/级)		A/4		5.5
(7) 上色率(130 ℃, 60 min)/%		85.0		5.6
(8) 提升力/级		A		5.7
(9) 有害芳香胺/(mg/kg)		符合 GB 19601 和 GB/T 24101 的标准要求		5.8
(10) 重金属元素/(mg/kg)		符合 GB 20814 的标准要求		5.9

<sup>a</sup> 供需双方协商决定是否控制测色色光指标。

#### 3.2 分散红 S-5BL 在涤纶织物上的色牢度

按本标准的 5.10 测定, 应不低于表 2 的规定。

表 2 分散红 S-5BL 在涤纶织物上的色牢度

染色深度	耐光(氯弧)	耐皂洗 60 ℃			耐 汗 渍			耐干热 210 ℃			耐摩擦		耐热压 200 ℃
					酸		碱						
		变色	棉沾	涤沾	变色	棉沾	涤沾	变色	棉沾	涤沾	干	湿	变色 (4 h 后)
1/1	5-6	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4	2-3	4	4-5	4-5

注: 1.5 % (owf) 相当于 1/1 染色标准深度。

### 4 采样

以批为单位采样, 一次拼混均匀的产品为一批。每批采样件数应符合 GB/T 6678—2003 中 7.6 的规定。所采样产品的包装必须完好, 采样时勿使外界杂质落入产品中。用探管从上、中、下三部分采样, 所采样品总量不得少于 200 g。将采得的样品充分混匀后, 分装于两个清洁、干燥、密封良好

的容器中，其上粘贴标签，注明产品名称、批号、生产厂名称、取样日期和地点。一个供检验，另一个保存备查。

## 5 试验方法

### 5.1 外观的评定

在自然北昼光下目视评定。

### 5.2 色光和强度的测定

#### 5.2.1 染色一般条件

染色时的一般条件应符合 GB/T 2374—2007 的有关规定。染色方法采用 GB/T 2394—2013 中 6.2 的高温加压染色法。

染色深度规定为 1.5 % (owf)，染浴 pH 值为 5.0 ~ 6.0。染色用 2 g 涤纶织物，染色浴比为 1 : 100；或用 5 g 涤纶织物，染色浴比为 1 : 20 或 1 : 40（在染色均匀的前提下，也可根据实际情况选择其他浴比）。

#### 5.2.2 染浴的配制

以 2 g 涤纶织物染色为例，于 5 个染杯中按表 3 的规定配制染浴。如使用 5 g 涤纶织物，则染料用量增加到 2.5 倍。

表 3 染浴的配制

单位为毫升

染浴组分	染样编号和染浴中各组分的体积				
	1	2	3	4	5
0.6 g/L 标样溶液	47.5	50	52.5		
0.6 g/L 试样溶液				47.5	50
水	152.5	150	147.5	152.5	150

#### 5.2.3 染色操作

染色操作按 GB/T 2394—2013 中 6.2 的规定进行。

#### 5.2.4 色光和强度的评定

按 GB/T 2374—2007 第 7 章的有关规定进行。按 GB/T 6688—2008 第 6 章的规定测定测色色光，测色色差按 CMC (2 : 1) 色差公式计算。

## 5.3 扩散性能的测定

按 GB/T 27597 的规定进行。

## 5.4 分散性的测定

按 GB/T 5540 的规定进行。

**HG/T 3429—2016****5.5 高温分散稳定性的测定**

按 GB/T 5541 的规定进行。

**5.6 上色率的测定**

按 GB/T 9337—2009 中有关“分散染料高温染色上色率的测定”的规定进行。染色浴比规定为 1 : 40, 染色深度规定为 1.5 % (owf)。测定波长为最大吸收波长(约 515 nm)。

**5.7 提升力的测定**

按 GB/T 2397 的规定进行。

**5.8 有害芳香胺的测定**

按 GB 19601 和 GB/T 24101 的规定进行。

**5.9 重金属元素的测定**

按 GB 20814 的规定进行。

**5.10 在涤纶织物上的色牢度的测定****5.10.1 一般规定**

所有色牢度的测试样应按 GB/T 4841.1—2006 的有关规定染成 1/1 染色标准深度。

**5.10.2 耐光色牢度的测定**

按 GB/T 8427—2008 的有关规定进行。

**5.10.3 耐皂洗色牢度的测定**

按 GB/T 3921—2008 的规定进行。试验条件采用 GB/T 3921—2008 表 2 中的试验方法 C (3)。

**5.10.4 耐汗渍色牢度的测定**

按 GB/T 3922—2013 的有关规定进行。

**5.10.5 耐干热色牢度的测定**

按 GB/T 5718—1997 的有关规定进行, 210 ℃。

**5.10.6 耐热压色牢度的测定**

按 GB/T 6152—1997 的有关规定进行, 200 ℃干压(4 h 后评定)。

**5.10.7 耐摩擦色牢度的测定**

按 GB/T 3920—2008 的有关规定进行。

**6 检验规则****6.1 检验分类**

本标准第 3 章所列的检验项目均为型式检验项目。其中本标准表 1 中(1)项~(6)项为出厂检

验项目，应逐批进行检验。

在正常连续生产情况下，每年至少进行一次型式检验。但如有下述情况需进行型式检验：

- a) 新产品最初定型时；
- b) 产品异地生产时；
- c) 生产配方、工艺及原材料有较大改变时；
- d) 停产 3 个月后恢复生产时；
- e) 客户提出要求时。

## 6.2 出厂检验

分散红 S-5BL 应由生产厂的质量检验部门检验合格，附合格证明后方可出厂。生产厂应保证所有出厂的分散红 S-5BL 产品均符合本标准的要求。

## 6.3 复检

如果检验结果中有一项指标不符合本标准的要求，应重新自两倍量的包装中取样进行检验，重新检验的结果即使只有一项指标不符合本标准的要求，则整批产品判定为不合格。

# 7 标志、标签、包装、运输和贮存

## 7.1 标志

分散红 S-5BL 的每个包装容器上都应涂印耐久、清晰的标志。

标志内容至少应有：

- a) 产品名称；
- b) 生产厂名称、地址；
- c) 生产日期；
- d) 净含量。

## 7.2 标签

产品应有标签，标签上应注明产品生产日期、合格证明、执行标准编号、批号。

## 7.3 包装

分散红 S-5BL 装于内衬塑料袋的包装容器内，并加密封，每件净含量  $25\text{ kg}\pm 0.2\text{ kg}$ 。其他包装可与用户协商确定。

## 7.4 运输

运输时应防止倒置，小心轻放，避免碰撞，切勿损坏包装。

## 7.5 贮存

分散红 S-5BL 应贮存于阴凉、干燥、通风处，防止受潮、受热。