



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14788—2018  
代替 GB/T 14788—1993

## 貉 皮

Raw nyctereutes procyonoides skin

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局 发布  
中国国家标准化管理委员会



## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 14788—1993《裘皮 貉皮》。本标准与 GB/T 14788—1993 相比,主要技术变化如下:

- 修改了标准名称;
- 删除了通用术语(见 1993 年版的第 2 章);
- 删除了加工要求(见 1993 年版的 4.1);
- 删除了貉皮分级要求中的等级比差(见 1993 年版的 4.2);
- 修改了检验规则(见第 6 章,1993 年版的第 6 章);
- 简化了包装、运输、贮存要求(见第 7 章,1993 年版的第 7 章)。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/TC 252)归口。

本标准起草单位:桐乡市中菱裘皮制品有限公司、嘉兴市皮毛和制鞋工业研究所、桐乡鑫诺皮草有限公司、中国皮革和制鞋工业研究院、嘉兴学院。

本标准主要起草人:张文军、张红林、曹利学、董荣华、陈晓红、赵立国、沈兵、步巧巧。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 14788—1993。



# 貉 皮

## 1 范围

本标准规定了貉皮的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、包装、运输和贮存。  
本标准适用于经宰杀后未经处理或仅经过适当保藏处理的生貉皮。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 2.1

**正季节皮** **skin in season**

毛被、板质成熟之皮。

### 2.2

**皮形完整** **form whole**

头、耳、鼻、尾齐全的皮张。

### 2.3

**板质良好** **nice hide**

皮板柔韧,富有弹性,油性好,光泽强,无明显色素。

### 2.4

**撑拉过大** **stretched**

上楦时将皮张强行拉长,致使毛绒空疏。

### 2.5

**刺脖** **sclerothrix necked**

颈部毛绒稀短。

### 2.6

**油烧板** **dermatome were soaked with fat**

皮板呈黄黑色,带有油垢、皱缩、脆硬。

### 2.7

**受闷脱毛** **shedders**

受湿、热、闷捂,造成脱毛。

### 2.8

**擦针** **rubbed**

局部毛针被磨损。

### 2.9

**蹲裆** **bald crotch**

臀部毛绒被磨损。

### 2.10

**塌脊** **sclerothrix back**

背中部针毛较两侧毛短疏。

2.11

缠结毛 matted

针绒毛缠结，呈束状、毡状。

2.12

自咬伤 bites

因患自咬病、食毛症，致使毛绒皮板残缺、破损。

2.13

疮疤 scar

患疮疖、疮疹处，板质硬结，毛绒发育不良。

2.14

透毛 leakage root of hair

刮油时用力过猛，板面露出毛根或毛绒。

3 分类

3.1 南貉皮

一般产于长江以南，张幅小，毛绒稀短，平顺，多呈橘黄色。

3.2 北貉皮

一般产于长江以北，张幅大，皮板肥壮，毛高绒厚，多呈青灰色或青黄色。

4 要求

4.1 南貉皮

南貉皮分级应符合表 1 的规定。

表 1 南貉皮分级

等级	品 质 要 求
一级	正季节皮，毛绒丰足，针毛齐全，色泽光润，板质良好；可带破洞 2 处，总面积不超过 11 cm <sup>2</sup>
二级	正季节皮，毛绒略空疏或略短薄，可带一级皮伤残或具一级皮毛质、板质；可带破洞 3 处，总面积不超过 17 cm <sup>2</sup>
三级	毛绒空疏或短薄，可带一级皮伤残或具有一级、二级皮毛质，板质；破洞总面积不超过 56 cm <sup>2</sup>
等外	不符合一级、二级、三级要求的皮张

4.2 北貉皮

北貉皮分级应符合表 2 的规定。

表 2 北貉皮分级

等级	品 质 要 求
一级	正季节皮,皮形完整,毛绒丰足,针毛齐全,绒毛清晰,色泽光润,板质良好,无伤残
二级	正季节皮,皮形完整,毛绒略空疏,针毛齐全,绒毛清晰,板质良好,无伤残,或具有一级皮质量,带有下列伤残之一者: ——下颚和腹部毛绒空疏,两肋或后臀部略显擦伤、擦针; ——自咬伤,疮疤和破洞,面积不超过 13.0 cm <sup>2</sup> ; ——破口长度不超过 7.6 cm; ——轻微流针飞绒; ——撑拉过大者
三级	皮形完整,毛绒空疏或短薄,或具有一级、二级品质,带有下列伤残之一者: ——刀伤,破洞总面积不超过 26.0 cm <sup>2</sup> ; ——破口长度不超过 15.2 cm; ——两肋或臀部毛绒擦伤较重; ——腹部无毛或较重刺脖
等外	不符合一级、二级、三级要求的皮张

4.3 颜色比差

颜色比差应符合表 3 的规定。

表 3 颜色比差

绒毛颜色	针毛尖颜色	比差/%
青灰色	黑色	100
黄褐色	褐色	90
白灰色	灰白色	60
白 色	黄白色	30

4.4 长度分级

长度分级应符合表 4 的规定。

表 4 长度分级要求

尺码号	00	0	1	2	3	4
长度( <i>l</i> )/cm	$l \geq 106$	$97 \leq l < 106$	$88 \leq l < 106$	$88 \leq l < 79$	$79 \leq l < 70$	$l < 70$

5 检验方法

5.1 总则

采用以量具测量与感官相结合的检验方法。

5.2 检验工具、设备与条件

- 5.2.1 测量工具,钢板尺、钢卷尺,精度 1 mm。
- 5.2.2 检验台,长、宽、高适度,台面平整,样品能在台上摊平。
- 5.2.3 检验条件,在自然光线充足,阳光不直射的室内检验。

5.3 毛绒检验

将皮平放于操作台上,一手按住皮的臀部,另一手捏住皮的头部,上下抖拍,使毛绒恢复自然状态。先看颈背部,后看腹部的毛绒是否丰足、平齐、灵活、光润及毛绒颜色,有无蹲裆、刺脖等伤残。

5.4 皮板检验

看皮型是否完整,脂肪是否去净,有无油烧板等伤残。手感皮板的厚薄,从板面颜色看季节特征和是否陈皮。

5.5 南貉皮面积测量

将皮平放于操作台上,用量尺从耳根至尾根量出长度,选择腰间适当部位量其宽度,长宽相乘,求出面积,见图 1。




图 1 南貉皮面积测量图

5.6 北貉皮长度测量

将皮平放于操作台上,用量尺自鼻尖至尾根量出长度,确定尺码号。

5.7 伤残面积测量

将皮平放于操作台上,用量尺量出伤残的长度、宽度、长宽相乘。

6 检验规则

6.1 组批

以同一品种、同一产地、同一规格的产品组成一个检验批。

6.2 检验

逐张进行检验,应符合第 4 章的规定。



## 7 包装、运输和贮存

### 7.1 包装

产品的包装应采用适宜的包装材料,防止产品受损。

### 7.2 运输、贮存

运输和储存应符合以下规定:

- 防曝晒、防雨雪;
  - 保持通风干燥,防蛀、防潮、防霉、防腐,避免高温环境;
  - 远离化学物质、液体侵蚀;
  - 避免尖锐物品的戳、划。
-





中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
貉 皮

GB/T 14788—2018

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线: 400-168-0010

2018年12月第一版

\*

书号: 155066 · 1-62049

版权专有 侵权必究



GB/T 14788—2018