

中华人民共和国国家标准

GB 1886.98—2024

食品安全国家标准

食品添加剂

乳糖醇(又名 4- $\beta$ -D 吡喃半乳糖-D-山梨醇)

2024-02-08 发布

2024-08-08 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会  
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

# 食品安全国家标准

## 食品添加剂 乳糖醇(又名 4- $\beta$ -D 吡喃半乳糖-D-山梨醇)

### 1 范围

本标准适用于以乳糖为原料,经氢化、净化、浓缩、干燥等工艺加工生产的食品添加剂乳糖醇(4- $\beta$ -D 吡喃半乳糖-D-山梨醇),产品分为无水乳糖醇、一水乳糖醇和二水乳糖醇。

### 2 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

#### 2.1 化学名称

4- $\beta$ -D 吡喃半乳糖-D-山梨醇


#### 2.2 分子式

无水乳糖醇: C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>11</sub>

一水乳糖醇: C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>11</sub> · H<sub>2</sub>O

二水乳糖醇: C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>O<sub>11</sub> · 2H<sub>2</sub>O

#### 2.3 结构式



#### 2.4 相对分子质量

无水乳糖醇: 344.3(按 2018 年国际相对原子质量)

一水乳糖醇: 362.3(按 2018 年国际相对原子质量)

二水乳糖醇: 380.3(按 2018 年国际相对原子质量)

### 3 技术要求

#### 3.1 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
色泽	白色结晶粉末或无色液体	将样品置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，
状态	结晶粉末或液体	观察其色泽和状态

### 3.2 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标			检验方法	
	无水 乳糖醇	一水 乳糖醇	二水 乳糖醇		
乳糖醇含量(以干基计), w/%	95.0~102.0			附录 A 中 A.3	
水分, w/%	结晶粉末	≤1.5	4.5~6.5	7.5~10.5	GB 5009.3 卡尔·费休法
	液体	≤	31.0		
氯化物(以干基计)/(mg/kg)	≤	100.0			A.4
硫酸盐(以干基计)/(mg/kg)	≤	200.0			A.5
灼烧残渣(以干基计), w/%	≤	0.1			A.6
其他多元醇(以干基计), w/%	≤	2.5			A.3
还原糖, w/%	≤	0.1			A.7
镍(Ni)/(mg/kg)	≤	2.0			GB 5009.138
铅(Pb)/(mg/kg)	≤	1.0			GB 5009.75 或 GB 5009.12

## 附录 A

### 检验方法

#### A.1 一般规定

本标准除另有规定外,所用试剂的纯度应在分析纯以上,所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品应按 GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603 的规定制备,试验用水应符合 GB/T 6682 中三级水的规定。高效液相色谱试验用水应符合 GB/T 6682 中一级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时,均指水溶液。

#### A.2 鉴别试验

##### A.2.1 溶解度

易溶于水。

##### A.2.2 比旋光度

样品溶液(100 g/L)的比旋光度  $\alpha_m$ (25 °C,D)为(+13~+15)(°)·dm<sup>2</sup>·kg<sup>-1</sup>。

##### A.2.3 高效液相色谱

在高效液相色谱分析中,样品主峰的保留时间应与乳糖醇标准样品主峰的保留时间一致,乳糖醇标准品的色谱图见附录 B。

#### A.3 乳糖醇含量和其他多元醇含量(以干基计)的测定

##### A.3.1 方法原理

用高效液相色谱法,在选定的工作条件下,通过色谱柱使样品溶液中各组分分离,用示差折光检测器检测。

##### A.3.2 试剂和材料

A.3.2.1 乳糖醇标准品。

A.3.2.2 半乳糖醇标准品。

A.3.2.3 山梨糖醇标准品。

A.3.2.4 0.45 μm 孔径的过滤膜,水相。

##### A.3.3 仪器和设备

A.3.3.1 高效液相色谱系统;配备示差折光检测器。

A.3.3.2 电子天平;感量 0.1 mg。

##### A.3.4 参考色谱分析条件

在推荐的色谱柱及典型操作条件下,各组分的参考保留时间见表 A.1,其他能达到同等分离程度的色谱柱和色谱操作条件均可使用。

A.3.4.1 色谱柱:以多孔性离子交换树脂 Aminex HPX 87 为填充剂的不锈钢柱(Φ7.8 mm × 300 mm)或其他等效色谱柱。

- A.3.4.2 流动相:水。
- A.3.4.3 流动速度:0.6 mL/min。
- A.3.4.4 柱温:60 °C±1 °C。
- A.3.4.5 进样量:10  $\mu$ L。

表 A.1 各组分的参考保留时间

组分名称	参考保留时间/min
乳糖醇	19.5
半乳糖醇	32.1
山梨糖醇	34.4

### A.3.5 分析步骤

#### A.3.5.1 标准溶液的制备

分别准确称取乳糖醇、半乳糖醇和山梨糖醇标准品各 0.1 g, 精确至 0.000 1 g, 置于 10 mL 容量瓶中, 加入适量水溶解, 定容, 配制成 10 mg/mL 的标准溶液。

#### A.3.5.2 试样溶液的制备

准确称取 4 g(以干基计)的试样, 精确至 0.001 g, 置于 100 mL 容量瓶中, 加入适量水溶解, 定容后作为试验溶液。

#### A.3.5.3 测定

分别将标准溶液和试样溶液注入色谱仪中, 记录色谱图; 测定所生成色谱图中的峰面积。各组分的参考保留时间和色谱图见图 B.1。

### A.3.6 结果计算

乳糖醇含量和其他多元醇含量  $w_i$ (以干基计)按式(A.1)计算:

$$w_i = \frac{m_s \times A_u}{m_u \times A_s} \times 100\% \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.1})$$

式中:

$m_s$  —— 标准品乳糖醇或其他多元醇的质量, 单位为克(g);

$A_u$  —— 试样溶液色谱图中乳糖醇或其他多元醇的峰面积值;

$m_u$  —— 试样干燥减量后的质量, 单位为克(g);

$A_s$  —— 标准溶液色谱图中乳糖醇或其他多元醇的峰面积值。

试验结果以平行测定结果的算术平均值为准, 平行测定结果的绝对差值不大于 0.5%。

### A.4 氯化物(以干基计)的测定

#### A.4.1 试剂和材料

- A.4.1.1 硝酸溶液:1+9。
- A.4.1.2 盐酸溶液:0.01 mol/L。
- A.4.1.3 硝酸银溶液:0.1 mol/L。

#### A.4.2 分析步骤

称取 10 g(以干基计)的试样,精确至 0.01 g,置于 50 mL 比色管中,加水 30 mL 溶解。如溶液呈碱性则用硝酸溶液中和,再加硝酸溶液 6 mL,加水至 50 mL。如样品为液态,则将样品加入比色管,加水至 50 mL。另取一 50 mL 比色管,加入 3.0 mL 盐酸溶液,加硝酸溶液 6 mL,加水至 50 mL。如溶液不够澄清,可预先将上述两溶液在相同条件下分别过滤。然后分别加入硝酸银溶液 1 mL,充分混合,在暗处放置 5 min,在黑色背景上从比色管上方观察两液体的浊度。试验溶液的浊度不得大于标准比浊溶液的浊度。

### A.5 硫酸盐(以干基计)的测定

#### A.5.1 试剂和材料

- A.5.1.1 盐酸溶液:1+4。
- A.5.1.2 氯化钡溶液:120 g/L。
- A.5.1.3 硫酸溶液:0.01 mol/L。

#### A.5.2 分析步骤

称取 10 g(以干基计)的试样,精确至 0.01 g,置于 50 mL 比色管中,加水 30 mL 溶解。如溶液呈碱性则用盐酸溶液中和,再加盐酸溶液 1 mL,加水至 50 mL。如样品为液态,则将样品加入比色管,加水至 50 mL。另取一个 50 mL 比色管,加入 4.0 mL 0.01 mol/L 的硫酸,加盐酸溶液 1 mL,加水至 50 mL。如溶液不够澄清,可预先过滤。然后分别加入氯化钡溶液 2 mL,充分混合,在暗处放置 10 min 后在黑色背景上从比色管上方观察两液体的浊度。试验溶液的浊度不得大于标准比浊溶液的浊度。

### A.6 灼烧残渣(以干基计)的测定

称取 2 g(以干基计)的试样,精确至 0.000 1 g。硫酸添加量为 0.5 mL。灼烧温度为 800 ℃ ± 25 ℃。其他按 GB/T 9741 测定。

### A.7 还原糖含量的测定

#### A.7.1 试剂和材料

- A.7.1.1 硫酸铜溶液:取硫酸铜( $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ )12.5 g,加水溶解并定容至 100 mL。
- A.7.1.2 碱性酒石酸盐溶液:称取酒石酸钾钠 34.6 g 和氢氧化钠 10 g,溶于水并稀释至 100 mL,放置 2 d 后,经玻璃棉过滤。

#### A.7.2 分析步骤

称取 7 g 试样,精确至 0.001 g,用 35 mL 水溶解于 400 mL 的烧杯中,混匀。加 25 mL 硫酸铜溶液和 25 mL 碱性酒石酸盐溶液。在烧杯上加盖玻璃,加热,使约在 4 min 内加热至沸并维持沸腾 2 min。用经过热水、乙醇和乙醚洗涤并在 100 ℃ 干燥 30 min 后质量恒定的布氏漏斗过滤,按顺序用热水、10 mL 乙醇和 10 mL 乙醚充分洗涤布氏漏斗,过滤物在 100 ℃ 下干燥 30 min。得到的氧化亚铜的质量不应大于 20 mg,相当于还原糖含量不超过 0.1%。

附录 B  
乳糖醇标准品液相色谱图

乳糖醇标准品液相色谱图见图 B.1。




图 B.1 乳糖醇标准品液相色谱图